

خودکشی سومین علت مرگ و میر در جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله است | در زنان بیوه، مطلقه و دارای وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر از سایر زنان است.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان:



تهمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان گفت:

در ایران اقدام به خودکشی در زنان بین دو تا سه برابر مردان اما فوت در مردان بین ۳ تا ۴ برابر زنان است.

به گزارش اسپادانا خبر، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه خودکشی در زنان بیوه، مطلقه و دارای وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر از سایر زنان است ادامه داد:

بر اساس آخرین برآوردهای WHO که تحت عنوان "خودکشی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹" منتشر شده است، خودکشی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است.

وی با بیان اینکه خودکشی همواره سومین یا چهارمین علت اصلی مرگ و میر در جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله برای هر دو جنس پس از «آسیب جاده ای» و «خشونت بین فردی» محسوب می شده است ادامه داد:

به همین دلیل کاهش میزان خودکشی در کشورها یک شاخص در برنامه های توسعه سازمان ملل متحد و یک برنامه اقدام برای سلامت روان است.

او گفت:

در سطح جهانی اکثر مرگ و میرهای ناشی از خودکشی در کشورهای با درآمد کم و متوسط (۷۷ درصد) رخ داده است و این همان جایی است که بیشتر جمعیت جهان در آن زندگی می کنند. بیش از نیمی از خودکشی های جهانی (۵۸ درصد) قبل از ۵۰ سالگی رخ داده است. بیشتر نوجوانانی نیز که بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند (۸۸ درصد) از کشورهای با درآمد کم و متوسط می باشند. به عبارتی در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و خودکشی در کشورهای کم درآمد یک و نیم برابر سایر کشورهاست. در کنار وضعیت اقتصادی در جوامع دچار بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی می توان طیف وسیعی از سایر عوامل نظیر مشکلات روانی اعم از افسردگی، دو قطبی بودن، اعتیاد به الکل، یا اختلال مصرف مواد و مشکلات فیزیکی اعم از ابتلا به بیماری های صعب العلاج و مشکلات اجتماعی اعم از کاهش تعاملات اجتماعی، مشکلات خانوادگی و عدم مهارت در کاهش و کنترل آنها را از جمله دلایل اغلب خودکشی ها دانست.

شاوردی ادامه داد:

در ایران متأسفانه دسترسی به مواد سمی از جمله قرص های برنج به راحتی امکان پذیر است به همین دلیل است که طی سال های اخیر از این وسیله برای خودکشی بیشتر استفاده می شود. همچنین در مناطق روستایی به دلیل دسترسی به سموم

شیمیایی این مواد بیشتر برای خودکشی مورد استفاده قرار می گیرند.

وی درباره چرایی سخت بودن دسترسی به آمار خودکشی با بیان اینکه جوامع معمولاً آمار رسمی اقدامات منجر به خودکشی را منتشر نمی کنند خاطر نشان کرد؛ شاید یکی از دلایل آن امکان شیوع و تسری این اقدام در میان سایر اقشار جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان باشد. تجربه نیز نشان داده است که خودکشی مانند سایر ناهنجاریهای اجتماعی زمینه و امکان تسری در میان سایر افراد را فراهم می کند. مثلاً وقتی در یک مدرسه یک دانش آموز خودکشی می کند سایر دانش آموزان نیز ممکن است به این عمل گرایش پیدا کنند. همین روند باعث می شود که در سراسر دنیا در صورت اقدام به خودکشی در مدارس بلافاصله نسبت به تعطیلی مدرسه و توزیع دانش آموزان در مدارس دیگر اقدام کنند. اعلام میزان دقیق خودکشی در سطح جامعه نیز به شیوع بیشتر آن منجر می شود. بنابراین ممکن است که مسئولین نیز از اعلام این آمار به جهت حفظ امنیت روانی جامعه خودداری کند. با این وجود می بایست دسترسی پژوهشگران و برخی از اقشار جامعه که متولی این حوزه می باشد به آمار دقیق و به روز با جزئیات کامل مهیا شود.

**برچسب ها:** [آسیب های اجتماعی](#) [1]

[فقر](#) [2]

[حقوق زنان](#) [3]