

بیماری رفلاکس معده آمار ۱۵ تا ۲۰ درصدی در جمعیت کشور دارد. ۱۵ درصد مردم مبتلا به سنگ‌های صفرا و بیش از ۲۰ درصد به یبوست مزمن مبتلا هستند.

شیوع ۴۰ تا ۵۰ درصدی کبد چرب و هلیکوباکتر پیلوری؛



فوق تخصص گوارش و بیماری‌های کبدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت:

کبد چرب و عفونت هلیکوباکتر پیلوری معده شیوع ۴۰ تا ۵۰ درصدی در ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او با بیان این که بیماری رفلاکس معده نسبتاً شایعی است که آمار ۱۵ تا ۲۰ درصدی در جمعیت کشور دارد ادامه داد:

بی‌تحركی، عادات بد غذایی و افزایش شیوع چاقی از جمله موارد تشدید کننده بیماری‌های گوارشی هستند.

وی گفت:

۱۵ درصد مردم کشور مبتلا به سنگ‌های صفرا و بیش از ۲۰ درصد جامعه به یبوست مزمن مبتلا هستند.

او اظهار داشت:

چنانچه جامعه هدف تحت برنامه‌های غربالگری قرار نگیرند از هر ۲۰ نفر یک نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ خواهد شد.

برچسب ها: [سلامت](#) [1]